

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS INDICADAS PARA CADA EDAD?



INGRESO AL JARDÍN DE INFANTES

Tener completas las vacunas indicadas para los **dos primeros años de vida**:

- **Pentavalente**
(difteria, tos convulsa, tétanos, hepatitis B y haemophilus influenzae B) y el refuerzo de la cuádruple a los 18 meses de edad.
- **Vacuna Conjugada de Neumococo:**
con tres dosis en el primer año de vida, o si ha recibido dos dosis entre los 12 y 24 meses de edad. Como esta vacuna ha sido incorporada en el año 2012, es probable que, salvo por indicación individual, muchos de ellos no la tengan aplicada.

- **Antipoliomelítica.**
- **Vacuna contra la hepatitis A:**
una dosis al año de edad.
- **Triple viral:**
una dosis al año de edad.
- **Antigripal:**
de los 6 a los 24 meses de edad.

NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 6 AÑOS

La aplicación de esta serie de vacunas es fundamental para completar el esquema de vacunación iniciado al nacer y brindar protección **hasta la adolescencia**:

- **Sabin**
(contra la poliomielitis).
- **Triple Viral**
(contra sarampión, rubéola y paperas).
- **Triple Bacteriana**
(contra difteria, tétanos y tos convulsa).

Si el niño pertenece a un grupo de riesgo (que presente enfermedades respiratorias como asma, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, enfermedades renales crónicas, entre otras) o de padecer gripe o complicaciones de la misma, debe recibir anualmente la vacuna antigripal.

VACUNAS OPCIONALES

Son indicadas por su pediatra en forma individual, además de las vacunas del Calendario:

- **Varicela**
- **Antimeningocócica**
- **Antigripal**



CHICAS Y CHICOS DE 11 AÑOS

- **Triple Bacteriana Acelular**
(contra difteria, tétanos y tos convulsa).

- **Vacuna contra la hepatitis B:**
Iniciar o completar el esquema de 3 dosis.

- **Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas):**
Iniciar o completar el esquema de 2 dosis.

- **Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano – VPH:**
indicada solo en las niñas para prevenir el cáncer de cuello de útero.

Por último, consultar al pediatra en caso de que el niño se encuentre enfermo o bajo tratamiento antes de vacunarlo.

