HOSPITAL PRIVADO
UNIVERSITARIO DE CORDOBA



AMBLIOPÍA

¿Qué es?

También conocida como "ojo vago", es mala agudeza visual de un ojo no desarrollado correctamente durante la infancia.

Frecuente en muchos niños, es importante corregirla durante la infancia o niñez temprana a fin de mejorar el desarrollo visual.

Controles Oftalmológicos

¿CUÁNDO REALIZARLOS?

- Al mes del nacimiento
- A los 6 meses
- Al año, y a partir de ese momento se deben realizar anualmente

HOSPITAL PRIVADO
UNIVERSITARIO DE CORDOBA

Cómo se desarrolla

LA VISIÓN NORMAL

1. El recién nacido es capaz de ver, y la visión mejora a medida que usa sus ojos en los primeros meses de vida
2. El sistema visual cambia rápidamente y la visión continúa desarrollándose en los primeros años de la infancia
3. Si el niño no puede usar sus ojos correctamente, la visión disminuye porque no se desarrolla adecuadamente
4. Después de los primeros ocho años de vida el sistema visual está definitivamente desarrollado, y ya no puede cambiar
5. Para una visión normal es necesario que ambos ojos se desarrollen por igual

HOSPITAL PRIVADO
UNIVERSITARIO DE CORDOBA

Ambliopía
CAUSAS

La origina cualquier condición que afecte el uso normal de los ojos. Destacan tres causas principales:

ESTRABISMO (OJOS DESVIADOS)

La desviación de los ojos reduce el desarrollo de la visión, por lo que niños estrábicos se ven en riesgo de desarrollar ambliopía

ERRORES DE REFRACCIÓN

Son condiciones que se corrigen con lentes. La ambliopía se produce cuando el ojo está fuera de foco (miopía, hipermetropía o astigmatismo en relación con el otro ojo)

El ojo que ve desenfocado o borroso se anula y se convierte en amblíope.
No es sencillo detectar cuando uno de los ojos del niño ve mal, ya que cuando tiene ambos ojos abiertos parece tener visión normal

La ambliopía puede ocurrir en ambos ojos si los mismos presentan visión borrosa.
Suele ocurrir cuando hay miopía, hipermetropía o astigmatismo alto

OPACIDAD EN LOS TEJIDOS TRANSPARENTES DEL OJO

Una enfermedad ocular como la catarata o alteraciones corneales producen la forma más grave de ambliopía

IMPORTANTE

La ambliopía se diagnostica mediante controles oftalmológicos periódicos