




### DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

## DE CUELLO DE ÚTERO

Tumor maligno que afecta la parte inferior del útero o matriz.









Es el **segundo cáncer femenino más frecuente**, después del cáncer de mama. Anualmente se registran alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos, y 1.800 mujeres mueren a causa de este cáncer.






## CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

#### ¿CUÁL ES LA CAUSA DEL **CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?**

La ocasiona una infección por el virus VPH (papilomavirus humano). Existen aproximadamente **100 tipos de VPH**, de los cuales 40 pueden infectar piel y mucosas. Algunos de estos virus pueden transformar células normales en cancerosas, por lo que se les denomina *virus oncogénicos*.



#### ¿CÓMO SE INFECTA UNA PERSONA CON **VPH ONCOGÉNICOS**?

Generalmente, los VPH oncogénicos son transmitidos sexualmente. Sin embargo, puede haber transmisión del virus a través del simple contacto íntimo, piel a piel, aún sin una relación sexual completa.



# Signos y síntomas VINCULADOS AL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO



Sangrado vaginal espontáneo



Flujo vaginal maloliente



Dolor pélvico










## PREVENCIÓN









El uso de preservativo disminuye la transmisión del VPH, aunque no la evita totalmente. Igualmente, es muy importante su uso para prevenir el resto de infecciones de transmisión sexual.



Los beneficios de la vacunación contra los principales virus que causan el cáncer de cuello útero incluyen no sólo la prevención de problemas físicos sino también psicológicos y sexuales asociados.

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE ÚTERO = PAPANICOLAOU + VACUNACIÓN

¿A QUÉ EDAD SE PUEDE APLICAR LA VACUNA? El Calendario Nacional de Vacunación incluye de forma obligatoria y gratuita 2 dosis de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero en niños y niñas de 11 años de edad.