

# PEDICULOSIS

## LA VIDA DEL PIOJO



Se alimenta de sangre cada 4-6 hs. Su saliva es irritante.



No salta ni vuela, sólo camina. Se transmite en forma directa entre personas.



La hembra vive 30 días, pone entre 6 y 10 liendres por día



La liendre, huevo del piojo, es de color blanco y se sujeta fuertemente al pelo.

## SEÑALES DE ALERTA Y DETECCIÓN

- ★ Ante la picazón y el contacto con otros niños, es importante realizar una revisión cuidadosa. El control debe ser periódico, ya que algunos niños no experimentan picazón
- ★ Tratar de encontrar no sólo liendres sino piojos vivos y/o huevos fecundados, situados a unos 6 mm. del cuero cabelludo.
- ★ Es importante revisar cuidadosamente el pelo húmedo sobre una toalla blanca, aplicando abundante acondicionador, utilizando peine fino y buena luz.

Las liendres sobreviven 10 días fuera del cuero cabelludo. Los piojos, 2 días.

Piojos y liendres pueden vivir en agua clorada, nunca a temperaturas superiores a 50°





## MÉTODOS SIN INSECTICIDA

### Miristato de isopropilo

Novedoso, actúa disolviendo la cutícula o exoesqueleto del parásito, generando así su deshidratación.

### Ciclopentaxiloxane, dimeticona 4%, ciclometicona

Recubre el parásito, lo inmoviliza y lo deshidrata.



Los métodos sin insecticida no generan resistencia

# TRATAMIENTOS DISPONIBLES



## MÉTODOS CON INSECTICIDA

### Piretrina

La más conocida es la permetrina al 1%, de efecto ovicida y parasiticida, aunque registra reportes de resistencia.

### Ivermectina 0,5% tópica

Buena tolerancia y seguridad ante la resistencia. Conviene acompañar todo tratamiento con la técnica del peine fino, **único apto para bebés.**

Aplicar bastante suavizante capilar sin aclarado, buscando liendres cerca del cuero cabelludo. Repetir el tratamiento durante 14 días, cada 24-72 hs.

*También facilita el desprendimiento de las liendres el vinagre diluido, ácido acético 5%, o ácido fórmico 8%*

## PREVENCIÓN

- ★ El piojo no puede fijar las liendres en el cabello grasiento, por eso se recomienda utilizar suavizante capilar sin aclarado
- ★ Usar preferentemente pelo corto o recogido
- ★ Usar gorro de baño en piletas de natación
- ★ Evitar compartir peines, gorros, almohadas y bufandas
- ★ Revisar la cabeza del niño una vez a la semana, por lo menos
- ★ Tratar de encontrar no sólo liendres sino piojos vivos y/o huevos fecundados, situados a unos 6 mm. del cuero cabelludo.



## **MEDIDAS DE LIMPIEZA** durante el tratamiento



**Lavar con agua caliente las sábanas y la ropa usada**



**Colocar en fundas de plástico durante 14 días aquellas prendas no lavables en agua caliente**



**Limpiar sillones y asientos de auto con aspiradora o repelente para pulgas y garrapatas**



**Lavar con agua caliente peines, cepillos y juguetes de uso diario**